

ТУБЕРКУЛЕЗ

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ



ВОЗБУДИТЕЛЬ

Mycobacterium tuberculosis.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

Чаще всего заражение происходит аэрогенным путем при длительном тесном контакте с больным открытой формой туберкулеза. При кашле, чихании, разговоре больной туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни.



ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

1. Кашель в течение 3-х недель и более.
2. Потеря веса.
3. Периодическое повышение температуры тела.
4. Потливость по ночам.
5. Общее недомогание и слабость.
6. Боли в грудной клетке.
7. Потеря аппетита.
8. Кровохарканье.




КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМОГАЮТ ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ?

1. Рентген-флюорография.
2. Анализ мокроты.
3. Проба Манту.
4. Диаскинтест.



ПРОФИЛАКТИКА

1. Вакцинопрофилактика в роддоме.
При заражении вакцинированные дети или вовсе не заболевают туберкулезом, или он протекает в легкой форме!
2. Проветривание помещений.
3. Качественное питание.
4. Повышение иммунитета.



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЛЕЧИТЬСЯ НУЖНО:

1. Полностью пройти весь курс лечения под наблюдением врача. Лечение туберкулеза должно продолжаться шесть и более месяцев.
2. Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерыв в лечении.
3. Своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.
4. Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую очень сложно, а иногда невозможно.

